

过氧化氢酶 (Catalase, CAT) 试剂盒 (钼酸铵比色法) 说明书

分光光度法 50 管/24 样

测定意义:

CAT(EC 1.11.1.6)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，是最主要的 H₂O₂ 清除酶，在活性氧清除系统中具有重要作用。

测定原理:

过氧化氢能氧化 MoO₂₊成 MoO₂₋,MoO₂₋接受氢氧根的电子成键，分子间立即脱水缩合，得到稳定的黄色复合物(H₂MoO₄ · XH₂O)_n 在 405nm 处有强烈吸收峰，其吸光值和过氧化氢浓度成线性关系。测定出体系剩余过氧化氢在 405nm 的吸光值即可反映 CAT 的催化活性。

需自备的仪器和用品:

可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水

试剂组成和配制:

提取液：液体 60 mL×1 瓶，4℃保存；

试剂一：液体 6 mL×1 瓶，4℃避光保存；

试剂二：液体 17 mL×1 瓶，常温保存；(过饱和试剂，如有结晶析出，可 37℃加热搅拌溶解) 试剂三：

液体 45 mL×1 瓶，4℃保存；(过饱和试剂，如有絮状沉淀，可 37℃加热搅拌溶解) 粗酶液提取：

1、细菌、细胞或组织样品的制备：

细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量

(104 个)：提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液)，超声波破碎细菌或细胞(冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

组织：按照组织质量 (g)：提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液)，进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

2、血清 (浆) 样品：直接检测。

测定步骤:

1、 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 405 nm。

2、 在 EP 管中加入下列试剂

试剂名称 (μL)	测定管	试剂名称 (μL)	对照管
样本	150	试剂一	90
试剂一	90	试剂二	300
混匀，25℃准确反应 10 min		试剂三	795
试剂二	300		混匀
试剂三	795	样本	150

混匀，取 1mL 于 1mL 玻璃比色皿中立即测定 A 测定和 A 对照， $\Delta A = A_{\text{对照}} - A_{\text{测定}}$ 。每个测定管需设一个对照管。

CAT 活性计算：

1、标准曲线： $y = 0.2x + 0.0013 \quad R^2 = 1$ x: 体系中过氧化氢浓度变化值 ($\mu\text{mol/mL}$)

y: 吸光值差值 ΔA

2、血清（浆）CAT 活力的计算：

单位的定义：每毫升血清（浆）每分钟催化 $1 \mu\text{mol H}_2\text{O}_2$ 降解定义为一个酶活力单位。

$$\text{CAT} (\mu\text{mol/min/mL}) = (\Delta A - 0.0013) \div 0.2 \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div T$$

$$= 4.45 \times (\Delta A - 0.0013)$$

3、组织、细菌或细胞中 CAT 活力计算：

(1) 按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化 $1 \mu\text{mol H}_2\text{O}_2$ 降解定义为一个酶活力单位。

$$\text{CAT} (\mu\text{mol/min/mg prot}) = (\Delta A - 0.0013) \div 0.2 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T$$

$$= 4.45 \times (\Delta A - 0.0013) \div C_{\text{pr}}$$

(2) 按样本鲜重计算：

单位的定义：每 g 组织每分钟催化 $1 \mu\text{mol H}_2\text{O}_2$ 降解定义为一个酶活力单位。

$$\text{CAT} (\mu\text{mol/min/g 鲜重}) = (\Delta A - 0.0013) \div 0.2 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 4.45 \times (\Delta A - 0.0013) \div W$$

V 反总：反应体系总体积，1.335 mL; V 样：加入样本体积，0.15 mL; V 样总：加入提取液体积，1 mL; T:

反应时间，10 min; W：样本质量，g; Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL。注意事项：

1、预实验若发现酶活性过高 ($A_{\text{测定}} < 0.1$)，可用提取液适当稀释样品后测定，并在计算公式中乘以相应稀释倍数。

2、若 $A_{\text{对照}} < A_{\text{测定}}$ ，一方面可能是酶活性过低，可将反应时间 10min 延长到 30min，另一方面可能样本中杂质干扰严重，可将样本稀释 5 倍左右后测定，并在计算公式中代入实际反应时间和乘以相应稀释倍数。